

RIKTLINJER SFFA 2024

Nationellt vårdprogram vid anafylaxi

Diagnoskriterier vid anafylaxi

Anafylaxi är mycket trolig om **ETT** av följande kriterier är uppfyllda:

1	2	3										
Akut insjuknande (minuter till timmar) som involverar:	Symtom från ≥ 2 av följande system efter exponering för, för den aktuella patienten, troligt utlösande allergen.	Blodtrycksfall efter exponering för, för den aktuella patienten, känt allergen.										
Hud och/eller slemhinna	Hud och/eller slemhinna	Blodtrycksfall										
och												
Luftvägar	Luftvägar											
eller												
Hjärt-kärl	Hjärt-kärl											
	GI-kanalen (persisterande symtom)											
		<table border="1"> <tr> <td>Åldersgrupp</td> <td>Systoliskt blodtryck</td> </tr> <tr> <td>Vuxna</td> <td><90 mmHg eller Sänkning på >30% fr basala blodtrycket</td> </tr> <tr> <td>Barn 1 mån-1 år</td> <td><70 mmHg</td> </tr> <tr> <td>1-10 år</td> <td><70 mmHg + (2 x ålder)</td> </tr> <tr> <td>>10 år</td> <td><90 mmHg</td> </tr> </table>	Åldersgrupp	Systoliskt blodtryck	Vuxna	<90 mmHg eller Sänkning på >30% fr basala blodtrycket	Barn 1 mån-1 år	<70 mmHg	1-10 år	<70 mmHg + (2 x ålder)	>10 år	<90 mmHg
Åldersgrupp	Systoliskt blodtryck											
Vuxna	<90 mmHg eller Sänkning på >30% fr basala blodtrycket											
Barn 1 mån-1 år	<70 mmHg											
1-10 år	<70 mmHg + (2 x ålder)											
>10 år	<90 mmHg											

Symtombeskrivning

- Hud och/eller slemhinna = Generell urtikaria • Kraftig klåda • Svullna läppar, uvula, tunga • Flushing
- Luftvägar = Dyspné • Pipande/väsande andning/bronkospasm • Hypoxi • Stridor • Sänkt PEF • Andningsstopp
- Hjärt-kärl = Hypotoni, synkope • Cirkulatoriskt chock • Hjärtstopp • Urin/fecesavgång
- GI-kanalen (persisterande symtom) = Persisterande symtom: Upprepad kräkning • Kraftig buksmärta • Diarré



EpiPen och EpiPen Jr (adrenalin) ATC-kod: C01CA24, Rx. F. **Indikation:** EpiPen (adrenalin) autoinjektor är avsedd för akutbehandling av allvarlig allergisk reaktion (anafylaxi) mot t.ex. insektsstick eller bett, födoämnen, läkemedel eller andra allergener, samt idiopatisk eller ansträngningsutlöst anafylaxi. **Varningar och försiktighet:** Alla patienter som fått EpiPen förskrivet ska noggrant instrueras så att de förstår indikationen för läkemedlet och kan administrera läkemedlet korrekt. Patienten ska instrueras att ringa 112 och begära ambulans samt uppge anafylaktisk chock och uppsöka akut medicinsk vård omedelbart efter administrering av den första dosen. Adrenalin ges vanligtvis med extrem försiktighet till patienter med hjärtåkomma. **Läkemedelsform:** Förfylld autoinjektor innehållande en dos adrenalin. **Styrka:** EpiPen 0,3 mg respektive EpiPen Jr 0,15 mg till barn (<30 kg). **Produktresumén** senast granskad: 2023-07-26. För ytterligare information och pris: www.fass.se. **Marknadsförs av:** Viatris AB, Tel: 08-630 19 00